

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO

CIDELY TOP

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Fungicida preventivo y curativo para el control de enfermedades fúngicas en Tomate, Pimiento, Pepino, Calabacín, Fresa, Berenjena, Melón y Sandía.

COMPOSICIÓN

12,5 % p/v Difenoconazol (125 g/l)
1,5% p/v Ciflufenamida (15 g/l)

Nº DE REGISTRO

ES-00056

FORMULACIÓN

Concentrado dispersable (DC)

PRESENTACIÓN

Formato	Uds. / embalaje	Palet kg/L
250ml	20	360
1L	12	400
5L	4	600

MODO DE ACCIÓN

CIDELY TOP es la combinación de dos materias activas (difenoconazol y ciflufenamida) Esta combinación proporciona un efecto fungicida de amplio espectro y largo plazo contra Oídio y oidiopsis (*Leveillula taurica*, *Erysiphe lycopersici*, *Golovinomyces cichoracearum*, *Podosphaera xanthii* y *Podosphaera macularis*), Alternaria (*Alternaria solani*, *Alternaria cucumerina*, *Alternaria* sp.), Cladosporiosis (*Fulvia fulva*, *Cladosporium cucumerinum*), Antracnosis (*Colletotrichum lagenarium*, *Colletotrichum acutatum*) y *Mycosphaerella* (*Didymella bryoniae*, *Mycosphaerella fragariae*)

El difenoconazol es un fungicida translaminar con efecto preventivo y curativo con un amplio espectro de control de enfermedades.

La ciflufenamida es muy activa en una amplia gama de oidios, con actividad preventiva, curativa y residual. Presenta movimiento translaminar, dentro de la planta, así como efecto vapor sobre la superficie.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	ÁMBITO DE UTILIZACIÓN	ESPECIE	DOSIS RECOMENDADA
Tomate, Pimiento y Berenjena	Invernadero y Aire libre	Oídio y oidiopsis (<i>Leveillula taurica</i> , <i>Erysiphe lycopersici</i>) Alternaria (<i>Alternaria solani</i>) Cladosporiosis (<i>Fulvia fulva</i>)	100 ml/hl (max 1 l/ha)
Calabacín, Pepino, Melón y Sandía	Invernadero y Aire libre	Oídio (<i>Podosphaera xanthii</i> , <i>Golomyovices cychoracearum</i>) Alternaria (<i>Alternaria cucumerina</i>), Mycosphaerella (<i>Didymella bryoniae</i>), Antracnosis (<i>Colletotrichum lagenarium</i>) Cladosporiosis (<i>Cladosporium cucumerinum</i>)	100 ml/hl (max 1 l/ha)
Fresa	Invernadero y Aire libre	Oídio (<i>Podosphaera macularis</i>) Alternaria (<i>Alternaria sp.</i>) Mycosphaerella (<i>Mycosphaerella fragariae</i>) Antracnosis (<i>Colletotrichum acutatum</i>)	100 ml/hl (max 1 l/ha)

Los tratamientos deberán iniciarse al comienzo del período de crecimiento, de forma preventiva, antes de establecimiento de la enfermedad.

Se aplicará en pulverización foliar normal, manual y con tractor al aire libre y manual en invernadero, a una dosis de 100 ml/hl, mojando uniformemente todo el cultivo.

No efectuar con este producto más de 2 tratamientos por periodo vegetativo. En fresa que se realizará una sola aplicación. El intervalo mínimo entre aplicaciones será de 10 días.

El volumen de caldo será de 300-1000 l/ha

Para prevenir la aparición de resistencias al oídio, no realizar más de 1/3 de las aplicaciones por periodo vegetativo con productos que contengan Ciflufenamida.

Compatibilidad con insectos beneficiosos: CIDELY TOP es compatible con *Orius laevigatus*, *Amblyseius Swirskii*, *Encarsia formosa*, *Eretmocerus mundus*, *Bombus terrestris* y *Nesidiocoris tenuis* utilizados en invernadero, siempre y cuando se utilice el producto conforme al patrón de uso indicado en esta etiqueta.

PLAZO DE SEGURIDAD y LMRs

CULTIVO	PLAZO DE SEGURIDAD (días)	LMR Difenconazol	LMR Ciflufenamida
Tomate	3	2 mg/kg	0,02* mg/kg
Pimiento	3	0,8 mg/kg	0,04 mg/kg
Berenjena	3	0,6 mg/kg	0,02* mg/kg
Pepino	3	0,3 mg/kg	0,04 mg/kg
Calabacín	3	0,3 mg/kg	0,05 mg/kg
Melón y Sandía	3	0,2 mg/kg	0,04 mg/kg
Fresa	3	0,4 mg/kg	0,04 mg/kg

*Límite de determinación analítica

“Los LMRs recogidos en esta tabla son los vigentes a la fecha de revisión indicada en el documento. Para información actualizada consultar la página oficial de la UE: [EU-pesticides-database](http://eu-pesticides-database)”

PREPARACIÓN DEL CALDO

Verter en un recipiente la cantidad de producto necesaria para una carga de la máquina de aplicación. Añadir un poco de agua agitando continuamente y verter este caldo en el depósito de la máquina, mediado de agua, con el agitador en funcionamiento, y completar con el agua necesaria. Mantener la agitación del caldo durante el tratamiento.

RIESGOS TOXICOLÓGICOS Y AMBIENTALES

- **Provoca lesiones oculares graves.**
- **Muy toxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos Duraderos**
- Evitar respirar la niebla
- Lavarse concienzudamente tras la manipulación
- Llevar guantes, prendas, y gafas de protección
- **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Recoger el vertido.



PRIMEROS AUXILIOS

- Retire a la persona de la zona contaminada.
- Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos, no olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel lave con abundante agua y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral.
- Mantenga al paciente en reposo. Conserve la temperatura corporal.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.
- Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas.
- Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase

FRASES DE RIESGO RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No contaminar el agua con el producto ni con su envase. No limpiar el equipo de aplicación de producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos.

AVES Y MAMÍFEROS -

ORGANISMOS ACUATICOS Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad con cubierta vegetal de 10 m hasta las masas de agua superficial.

ABEJAS -

ARTRÓPODOS -

LOMBRICES -

PRECAUCIONES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DEL OPERADOR/TRABAJADOR

El aplicador deberá utilizar guantes en la mezcla/carga, aplicación, al manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas y durante la reentrada en cultivos de tomate, berenjena y fresa. Se utilizará ropa tipo 6: contra salpicaduras de productos líquidos.

Lávese toda la ropa de protección después de usarla.

El recipiente debe abrirse al aire libre y en tiempo seco.

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

Syngenta España, S.A.
C/ Ribera del Loira, 8 – 10 3ª planta
28042 – Madrid
Telf.: 91 387 64 10
www.syngenta.es